

О СТРОГО 2-МАКСИМАЛЬНЫХ ПОДГРУППАХ КОНЕЧНЫХ ГРУПП

М.Н. Коновалова¹, В.С. Монахов², И.Л. Сохор³¹Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Брянск²Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины³Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина

ON STRICTLY 2-MAXIMAL SUBGROUPS OF FINITE GROUPS

M.N. Konovalova¹, V.S. Monakhov², I.L. Sokhor³¹Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Bryansk²Francisk Skorina Gomel State University³Brest State A.S. Pushkin University

Аннотация. Приводятся примеры конечных разрешимых и простых групп, в которых каждая 2-максимальная подгруппа является строго 2-максимальной. Доказывается, что если в группе G существует строго 2-максимальная подгруппа порядка 2, то группа является сверхразрешимой группой порядка $2pq$, где p и q – простые числа, не обязательно различные, либо G изоморфна знакопеременной группе A_4 . Устанавливается строение конечной группы, в которой каждая 2-максимальная подгруппа является холловой. Для наследственной насыщенной решеточной формации $\mathfrak{F}$, содержащей все нильпотентные группы, и группы $G \notin \mathfrak{F}$ доказывается, что требование $\mathfrak{F}$ -субнормальности всех строго 2-максимальных подгрупп совпадает с требованием субнормальности всех 2-максимальных подгрупп.

Ключевые слова: конечная группа, 2-максимальная подгруппа, строго 2-максимальная подгруппа, холлова подгруппа, решеточная формация.

Для цитирования: Коновалова, М.Н. О строго 2-максимальных подгруппах конечных групп / М.Н. Коновалова, В.С. Монахов, И.Л. Сохор // Проблемы физики, математики и техники. – 2021. – № 4 (49). – С. 95–100. – DOI: https://doi.org/10.54341/20778708_2021_4_49_95

Abstract. We give examples of finite soluble and simple groups in which every 2-maximal subgroup is strictly 2-maximal. We prove that if in a group G there is a strictly 2-maximal subgroup of order 2, then G is a supersoluble group of order $2pq$, where p and q are primes, not necessarily distinct, or G is isomorphic to the alternating group A_4 . We establish the structure of a finite group in which every 2-maximal subgroup is a Hall subgroup. We prove that the requirement of $\mathfrak{F}$ -subnormality of all strictly 2-maximal subgroups coincides with the requirement of subnormality of all 2-maximal subgroups of a group G for a subgroup-closed saturated lattice formation $\mathfrak{F}$ containing all nilpotent groups and $G \notin \mathfrak{F}$.

Keywords: finite group, 2-maximal subgroup, strictly 2-maximal subgroup, Hall subgroup, lattice formation.

For citation: Konovalova, M.N. On strictly 2-maximal subgroups of finite groups / M.N. Konovalova, V.S. Monakhov, I.L. Sokhor // Problems of Physics, Mathematics and Technics. – 2021. – № 4 (49). – P. 95–100. – DOI: https://doi.org/10.54341/20778708_2021_4_49_95 (in Russian)

Введение

Все рассматриваемые группы предполагаются конечными. Запись $H \leq G$ ($H < G$) означает, что H – подгруппа (собственная подгруппа) группы G . Подгруппа M группы G называется максимальной подгруппой, обозначается $M < G$, если $M < G$ и из включений $M \leq H \leq G$ следует, что $M = H$ или $H = G$.

Пусть G – группа и H – подгруппа группы G . Будем использовать обозначение:

$$\text{Max}(G, H) = \{M < G \mid H \leq M\}.$$

Если $H = 1$ – единичная подгруппа группы G , то вместо $\text{Max}(G, 1)$ пишем $\text{Max}(G)$, где $\text{Max}(G)$ – множество всех максимальных подгрупп группы G . Следует отметить, что $\text{Max}(G) = \emptyset$ в точности тогда, когда $G = 1$.

Подгруппа H группы G называется 2-максимальной подгруппой группы G , если существует подгруппа $M \in \text{Max}(G, H)$ такая, что $H < M$; n -максимальной подгруппой группы G для $n \geq 3$, если существует подгруппа $M \in \text{Max}(G, H)$ такая, что $H = (n-1)$ -максимальная подгруппа в M .

Существуют группы, в которых одна и та же подгруппа одновременно является 2-максимальной и n -максимальной подгруппой для $n \geq 3$. Например, в группе $L_2(8)$ [1, IdGroup(504,156)] подгруппа C_2 является 2-максимальной, 3-максимальной и 4-максимальной подгруппой:

$$C_2 < D_{14} < L_2(8),$$

$$C_2 < S_3 < D_{18} < L_2(8),$$

$$C_2 < C_2^2 < C_2^3 < C_2^3 \rtimes C_7 < L_2(8).$$

Монахов В.С. и Княгина В.Н. [2, пример 3] привели пример групп, в которых для любого $n \geq 3$ некоторая 2-максимальная подгруппа является n -максимальной.

Вместе с тем, существуют ситуации, когда 2-максимальная подгруппа остается 2-максимальной в любых цепочках подгрупп. Подгруппа H группы G называется строго 2-максимальной подгруппой группы G , если $H \leq M$ для всех $M \in \text{Max}(G, H)$. Ясно, что строго 2-максимальная подгруппа группы G 2-максимальна в G и не является n -максимальной в G ни для какого $n \geq 3$.

Через $\text{Max}_2(G)$ будем обозначать множество всех 2-максимальных подгрупп группы G , через $\text{Max}_2^*(G)$ – множество всех строго 2-максимальных подгрупп группы G . Если

$$H \in \text{Max}_2(G) \setminus \text{Max}_2^*(G),$$

то согласно [3] подгруппа H называется слабо 2-максимальной подгруппой группы G .

Ясно, что $\text{Max}_2(G) = \emptyset$ в точности тогда, когда $G = 1$ или $|G|$ – простое число. Из леммы об индексах следует, что 2-максимальная подгруппа наименьшего индекса будет строго 2-максимальной, см. лемму 2.1. Поэтому $\text{Max}_2^*(G) \neq \emptyset$ для любой группы $G \neq 1$ непростого порядка.

Второй автор данной работы сформулировал следующую проблему: «Каковы главные факторы конечной группы, в которой каждая 2-максимальная подгруппа не является n -максимальной для любого $n \geq 3$?» [4, 19.54]. Эта проблема рассматривалась в [3], [5], [6].

Если каждая 2-максимальная подгруппа группы G не является n -максимальной для $n \geq 3$, то $\text{Max}_2(G) = \text{Max}_2^*(G)$, т. е. каждая 2-максимальная подгруппа группы G строго 2-максимальна. Поэтому указанная проблема может быть сформулирована следующим образом: «Каковы главные факторы конечной группы, в которой $\text{Max}_2(G) = \text{Max}_2^*(G)$?»

В разделе 2 мы приводим примеры групп, в которых $\text{Max}_2(G) = \text{Max}_2^*(G)$, и некоторые наблюдения о строго 2-максимальных подгруппах.

В разделе 3 мы рассматриваем свойства групп с 2-максимальной подгруппой порядка 2. Такими группами являются, например, группы $L_2(8)$ и $L_2(13)$. В случае, когда в группе существует строго 2-максимальная подгруппа порядка 2, группа является сверхразрешимой группой порядка $4p$, $2pq$ или $2p^2$, где p и q – различные простые числа, либо изоморфна A_4 , см. теорему 3.1.

В разделе 4 мы изучаем группу, в которой каждая 2-максимальная подгруппа является холловой, см. теорему 4.1. Опираясь на результаты Масловой Н.В. и Ревина Д.О. [7], мы получаем

разрешимость группы, а затем применяем описание из [8].

Ю.В. Луценко и А.Н. Скиба [9] показали, что в ненильпотентной группе с субнормальными 2-максимальными подгруппами все собственные подгруппы абелевы. Этот результат остается верным, если субнормальными являются строго 2-максимальные подгруппы [10]. Группы с формационно субнормальными подгруппами исследовались в [11]–[14]. В разделе 5 мы рассматриваем группы с формационно субнормальными строго 2-максимальными подгруппами в случае, когда формация решеточная. В этой ситуации требование $\mathfrak{F}$ -субнормальности всех строго 2-максимальных подгрупп совпадает с требованием субнормальности всех 2-максимальных подгрупп, см. теорему 5.1.

1 Вспомогательные результаты

Лемма 1.1 [15, теорема 1.39]. Пусть $H \leq K \leq G$ и G – группа. Если T – правая трансверсаль H в K , а S – правая трансверсаль K в G , то TS – правая трансверсаль H в G . В частности, $|G:H| = |G:K| |K:H|$.

Лемма 1.2 [16, лемма 4.1], [17, II.3.10]. Пусть A – неприводимая абелева группа автоморфизмов группы B , $|B| = p^m > 1$. Тогда A – циклическая группа и m – наименьшее натуральное число такое, что $|A|$ делит $p^m - 1$.

Лемма 1.3 [17, IV.2.6]. Пусть p – силовская p -подгруппа группы G такая, что $P \leq Z(N_G(P))$ (т. е. $C_G(P) = N_G(P)$ и поэтому P абелева). Тогда существует нормальная подгруппа N группы G такая, что $G/N \cong P$.

Лемма 1.4 [17, IV.2.8]. Пусть p – наименьший простой делитель порядка группы G . Если группа G имеет циклическую силовскую p -подгруппу P , то существует нормальная подгруппа N группы G такая, что $G/N \cong P$.

Лемма 1.5 [17, II.8.17]. Пусть G – группа порядка 12 или 24. Если G содержит элементарную абелеву нормальную подгруппу порядка 4 и $C_G(N) = N$, то либо $G \cong A_4$, либо $G \cong S_4$.

Лемма 1.6 [17, IV.7.4]. Пусть H – максимальная подгруппа группы G . Если H нильпотентна и $Z(P) \leq P'$, где p – силовская 2-подгруппа из H , то группа G разрешима.

Лемма 1.7. Если в группе M существует максимальная подгруппа K порядка 2, то $|M| = 2p$, p – простое, $p \geq 2$.

Доказательство. Если K нормальна в M , то $|M| = 2p$, p – простое, $p \geq 2$. Пусть K не нормальна в M . Тогда K – силовская 2-подгруппа группы M , $M = N \rtimes K$ и по лемме 1.4 $N \leq M$. Поскольку K действует неприводимо на N , то $|N| = p$ по лемме 1.2. $\square$

Лемма 1.8. Если G – несверхразрешимая группа порядка $4p$, p – простое, то $G \cong A_4$.

Доказательство. Пусть p и q – силовские p - и 2 -подгруппы группы G . Если $Q = N_G(Q)$, то p нормальна в G по лемме 1.3 и G сверхразрешима [17, VI.9], противоречие с условием. Поэтому Q нормальна в G . Если в G существует нормальная подгруппа Q_1 порядка 2 , то $|G/Q_1| = 2p$ и G сверхразрешима [17, VI.9], противоречие с условием. Поэтому Q – минимальная нормальная в G подгруппа, $Q = C_G(Q)$ и P действует неприводимо на Q . По лемме 1.2 $p = 3$ и $G \cong A_4$ по лемме 1.5. $\square$

2 О группах, в которых $\text{Max}_2(G) = \text{Max}_2^*(G)$

Лемма 2.1. Если G – неединичная группа не простого порядка, то $\text{Max}_2^*(G) \neq \emptyset$.

Доказательство. Пусть G – неединичная группа не простого порядка и H – ее 2-максимальная подгруппа наименьшего индекса среди всех 2-максимальных подгрупп группы G . Предположим, что H не является строго 2-максимальной подгруппой. Тогда существует подгруппа $M \in \text{Max}(G, H)$ такая, что H не является максимальной подгруппой в M . Значит, в M существует подгруппа K такая, что $H < K < M$. По лемме 1.1

$$|G:H| = |G:K| |K:H|, \\ |K:H| \neq 1, |G:K| < |G:H|.$$

Таким образом, K – 2-максимальная подгруппа группы G и $|G:K| < |G:H|$, что противоречит выбору H . Отсюда заключаем, что H является строго 2-максимальной подгруппой в G . $\square$

Лемма 2.2. Пусть H – 2-максимальная подгруппа группы G , $H < M < G$. Если индексы $|G:M|$ и $|M:H|$ – простые числа, то H – строго 2-максимальная подгруппа группы G . В частности, если G – сверхразрешимая группа, то

$$\text{Max}_2(G) = \text{Max}_2^*(G).$$

Доказательство. Предположим, что H – 2-максимальная подгруппа группы G , $H < M < G$ и индексы $|G:M|$ и $|M:H|$ – простые числа. Допустим, что H не является строго 2-максимальной подгруппой группы G . Тогда в G есть подгруппа K такая, что $H < K < G$ и H 2-максимальна в K . Следовательно, существует подгруппа L такая, что $H < L < K < G$. По лемме 1.1

$$|G:H| = |G:K| |K:L| |L:H|, \\ |G:K| \neq 1, |K:L| \neq 1, |L:H| \neq 1,$$

значит, $|G:H|$ делится на три простых числа, противоречие. Таким образом, H – строго 2-максимальная подгруппа группы G .

Пусть $H < M < G$ и пусть G – сверхразрешимая группа. По теореме Хупперта [17, VI.9.5], $|G:H|$ делится в точности на два простых числа,

не обязательно различных. Если $H < X < G$, то $|X:H|$ – простое число и H – максимальная подгруппа группы X . Поскольку X – произвольная максимальная подгруппа в G , содержащая H , то H – строго 2-максимальная подгруппа группы G . $\square$

Приведем примеры несверхразрешимых групп, в которых $\text{Max}_2(G) = \text{Max}_2^*(G)$.

Пример 2.1. Для группы $C_3^2 \rtimes C_8$ из [1, IdGroup(72,39)], [20] следует:

$$\text{Max}(C_3^2 \rtimes C_8) = \{C_8, C_3^2 \rtimes C_4\},$$

$$\text{Max}_2(C_3^2 \rtimes C_8) = \{C_4, C_3 \rtimes S_3\} = \text{Max}_2^*(C_3^2 \rtimes C_8).$$

Пример 2.2. Для группы $U_3(2)$ из [1, IdGroup(72,41)], [20] следует:

$$\text{Max}(U_3(2)) = \{Q_8, C_3^2 \rtimes C_4\},$$

$$\text{Max}_2(U_3(2)) = \{C_4, C_3 \rtimes S_3\} = \text{Max}_2^*(U_3(2)).$$

Пример 2.3. Для группы $L_2(17)$ из [1, [19, p. 9], [18] следует:

$$\text{Max}(L_2(17)) = \{C_{17} \rtimes C_8, S_4, D_{18}, D_{16}\},$$

$$\text{Max}_2(L_2(17)) = \{C_{17} \rtimes C_4, C_8, A_4, D_8, S_3, C_9\} = \\ = \text{Max}_2^*(L_2(17)).$$

Пример 2.4. Для группы $U_3(3)$ из [1, [18], [19, p. 9] следует:

$$\text{Max}(U_3(3)) =$$

$$= \{(C_3^2 \rtimes C_3) \rtimes C_8, (C_4^2 \rtimes C_3) \rtimes C_2, SL_2(3) \rtimes C_4, L_3(2)\},$$

$$\text{Max}_2(U_3(3)) =$$

$$= \{(C_3^2 \rtimes C_3) \rtimes C_4, ((C_4 \times C_2) \rtimes C_2) \rtimes C_3,$$

$$C_4^2 \rtimes C_2, C_4^2 \rtimes C_3, C_7 \rtimes C_3, C_3 \rtimes C_8, S_4\} =$$

$$= \text{Max}_2^*(U_3(3)).$$

3 Группы с 2-максимальной подгруппой порядка 2

Для неединичной группы G рассмотрим цепочку подгрупп

$$1 = G_i < G_{i-1} < \dots < G_1 < G_0 = G,$$

в которой каждая G_i является максимальной подгруппой G_{i-1} . Число подгрупп в такой цепочке называется ее длиной. Длина группы G , обозначаемая через $l(G)$, есть максимальная длина таких цепочек. Глубина группы G , обозначаемая через $\lambda(G)$, есть минимальная длина таких цепочек. Если $1 \leq \lambda(G) \leq 2$, то G – группа простого порядка или группа с максимальной подгруппой простого порядка.

Предположим, что в группе G есть 2-максимальная подгруппа K простого порядка. Тогда $1 < K < M < G$ и $\lambda(G) = 3$.

Лемма 3.1 [21, теорема 1]. Группа G имеет глубину 3 тогда и только тогда, когда либо G – разрешима и ее главный ряд имеет длину 3, либо G – одна из простых групп таблицы 3.1.

Таблица 3.1. – Простые группы G

G	Условия
A_p	p и $(p-1)/2$ простые и $p \notin \{7, 11, 23\}$
$L_2(q)$	$(q+1)/(2, q-1)$ или $(q-1)/(2, q-1)$ простые, $q \neq 9$, или q простое и $q \equiv \pm 3, \pm 13 \pmod{40}$, или $q = 3^k$ с простым $k \geq 3$;
$L_n^\epsilon(q)$	n и $\frac{q^n - \epsilon}{(q - \epsilon)(n, q - \epsilon)}$ простые, $n \geq 3$ и $(n, q, \epsilon) \neq (3, 4, +), (3, 3, -), (3, 5, -), (5, 2, -)$
${}^2B_2(q)$	$q-1$ простое
$M_{23}, \mathbb{B}$	

Из леммы 3.1 вытекает следующая лемма.

Лемма 3.2. *Группа G имеет 2-максимальную подгруппу K порядка 2, $K < M < G$, тогда и только тогда, когда либо G разрешима и ее главный ряд имеет длину 3, либо G – простая группа и справедливо одно из следующих утверждений:*

- (1) $G \cong L_2(2^k)$, $M \cong D_{2(2^k \pm 1)}$, $2^k \pm 1$ – простое;
- (2) $G \cong L_2(q)$, $M \cong D_{q \pm 1}$, $(q \pm 1)/2$ – простое, $q \neq 9$;
- (3) $G \cong {}^2B_2(q)$, $M \cong D_{2(q-1)}$, $q-1$ – простое.

Пример 3.1. В знакопеременной группе A_5 степени 5 $[1, \text{IdGroup}(60, 5)]$ подгруппы порядка 3 и 5 являются строго 2-максимальными подгруппами. Подгруппа порядка 2 является слабо 2-максимальной подгруппой.

Пример 3.2. В знакопеременной группе $A_4 = C_2^2 \rtimes C_3$ степени 4 $[1, \text{IdGroup}(12, 3)]$ подгруппа порядка 2 является строго 2-максимальной подгруппой.

Теорема 3.1. *Если в группе G существует строго 2-максимальная подгруппа порядка 2, то G является сверхразрешимой группой порядка $2pq$, где p и q – простые числа, не обязательно различные, либо G изоморфна знакопеременной группе степени 4.*

Доказательство. Зафиксируем в группе G строго 2-максимальную подгруппу K порядка 2. Если G – 2-группа, то $|G| = 8$. Пусть G – не 2-группа. Если K – силовская 2-подгруппа группы G , то G 2-нильпотентна по лемме 1.4. Если $K < G_2$, где G_2 – силовская 2-подгруппа группы G , то G_2 – максимальная подгруппа группы G и $|G_2| = 4$. По лемме 1.6 группа G разрешима.

Пусть M – произвольная максимальная подгруппа группы G , содержащая K . По условию подгруппа K максимальна в M . Согласно лемме 1.7 либо $|M| = 4$, либо $|M| = 2p$, p – простое нечетное число.

Пусть $|M| = 4$. Если M нормальна в G , то $|G| = 4r$, r – простое нечетное. Если M не нормальна в G , то $M = N_G(M)$ и по лемме 1.3 существует нормальная в G подгруппа Q такая, что $G = Q \rtimes M$. Подгруппа $Q \rtimes K$ максимальна в G . По условию подгруппа K будет максимальной в $Q \rtimes K$, поэтому $|Q| = q$ по лемме 1.7 и $|G| = 4q$, q – нечетное простое.

Пусть $|M| = 2p$, p – простое нечетное число. Если M нормальна в G , то $|G| = 2p^2$ или $|G| = 2pr$, r – простое, $r \neq p$. Пусть M не нормальна в G , тогда $M = N_G(M)$ и $|G : M| = t^a > 2$, t – простое нечетное. Если $p \neq t$, то KG_t – максимальная в G подгруппа, где G_t – силовская t -подгруппа группы G . По условию подгруппа K максимальна в KG_t и $|G| = 2pt$ по лемме 1.7. Пусть $p = r$. Тогда P нормальна в G , где P – силовская p -подгруппа из M . В фактор-группе G/P подгруппа M/P максимальна и имеет порядок 2, поэтому $|G/P : M/P| = p$ по лемме 1.7 и $|G| = 2p^2$.

Группы порядков $2pq$ и $2p^2$ сверхразрешимы. Согласно лемме 2.2 в сверхразрешимой группе любая 2-максимальная подгруппа является строго 2-максимальной. Поэтому любая группа порядка $2pq$, $2p^2$ и сверхразрешимые группы порядка $4p$ удовлетворяют условию теоремы. Несверхразрешимая группа порядка $4p$ изоморфна A_4 по лемме 1.8, эта группа также удовлетворяет условию теоремы ввиду примера 3.2. $\square$

Пример 3.3. В простых группах $L_2(8)$ и $L_2(13)$ есть максимальная подгруппа, изоморфная D_{14} , поэтому подгруппа порядка 2 является 2-максимальной подгруппой в этих группах. В простой группе $L_2(23)$ есть максимальная подгруппа D_{22} , поэтому подгруппа порядка 2 в группе $L_2(23)$ является 2-максимальной подгруппой. Поэтому в теореме 3.1 слово «строго» убрать нельзя.

4 Группы с холловыми 2-максимальными подгруппами

Напомним, что подгруппа H группы G называется холловой подгруппой, если $|H|$ и $|G : H|$ взаимно просты. Зафиксируем следующие обозначения: $\pi(G)$ – множество всех простых делителей порядка группы G ; G_p – силовская p -подгруппа группы G ;

$$\sigma(G) = \{r \in \pi(G) : |G_r| = r\};$$

$$\tau(G) = \{r \in \pi(G) : |G_r| > r\}.$$

Ясно, что $\pi(G) = \sigma(G) \cup \tau(G)$ и $\sigma(G) \cap \tau(G) = \emptyset$. Через $G_{\sigma(G)}$ и $G_{\tau(G)}$ обозначаются $\sigma(G)$ -холлова и $\tau(G)$ -холлова подгруппы группы G .

Говорят, что группа G имеет силовскую башню, если она обладает нормальным рядом, факторы которого изоморфны силовским подгруппам.

Подгруппой Гашюца группы G называется подгруппа W , удовлетворяющая следующим двум условиям:

- (1) W сверхразрешима;
- (2) если $W \leq A < B \leq G$, то $|B : A|$ – не простое число.

В любой разрешимой группе подгруппы Гашюца существуют и сопряжены [15, теорема 5.29].

Сверхразрешимым корадикалом группы G называется наименьшая нормальная в G подгруппа, фактор-группа по которой сверхразрешима.

Теорема 4.1. Пусть G – непримарная группа, в которой каждая 2-максимальная подгруппа является холловой подгруппой. Если G – сверхразрешимая группа, то ее порядок свободен от квадратов, т. е. $\pi(G) = \sigma(G)$. Пусть G – несверхразрешимая группа. Тогда справедливы следующие утверждения:

- (1) группа G имеет силовскую башню и каждая максимальная в G подгруппа является холловой подгруппой;
- (2) $|\sigma(G)| \geq 2$ и $G_{\sigma(G)} \leq W$, где W – подгруппа Гашюца группы G ;
- (3) $|\tau(G)| \geq 1$ и $G_{\tau(G)}$ является сверхразрешимым корадикалом группы G .

Доказательство теоремы 4.1 осуществляется по следующей схеме. Вначале опираясь на результаты Н.В. Масловой и Д.О. Ревина [7], мы получаем разрешимость группы, затем доказываем утверждение (1) теоремы и применяем описание групп из [8].

Из теоремы 4.1 вытекает, что бипримарные группы с холловыми 2-максимальными подгруппами имеют порядок pq . Трипримарные группы могут быть несверхразрешимыми.

Пример 4.1. В полной линейной группе $GL_2(29)$ есть циклическая подгруппа C_{15} порядка 15, которая действует неприводимо на элементарной абелевой группе C_{29}^2 порядка 29^2 . В полупрямом произведении $C_{29}^2 \rtimes C_{15}$ все максимальные подгруппы и все 2-максимальные подгруппы холловы.

5 Группы с формационными ограничениями на 2-максимальные подгруппы

Пусть $\mathfrak{F}$ – формация, G – группа. Пересечение всех нормальных подгрупп группы G , фактор-группы по которым принадлежат $\mathfrak{F}$, обозначается через $G^{\mathfrak{F}}$ и называется $\mathfrak{F}$ -корадикалом группы G .

Подгруппа H группы G называется $\mathfrak{F}$ -субнормальной в G , если $H = G$ или существует цепочка подгрупп

$$H = H_0 < H_1 < \dots < H_{n-1} < H_n = G$$

такая, что $H_i^{\mathfrak{F}} \leq H_{i-1}$ для всех i [16, II.8].

В случае, когда $H < G$ и H $\mathfrak{F}$ -субнормальна в G , говорят, что H $\mathfrak{F}$ -нормальна в G . В любой группе $\mathfrak{N}$ -субнормальная подгруппа субнормальна, а в разрешимых группах верно и обратное утверждение: субнормальная подгруппа разрешимой группы $\mathfrak{N}$ -субнормальна, см. [16], [22, лемма 1.11].

Формация $\mathfrak{F}$ называется решеточной, если в любой группе множество всех ее $\mathfrak{F}$ -субнормальных подгрупп образует подрешетку решетки всех подгрупп. Решеточные формации описаны в работе [23].

Теорема 5.1. Пусть $\mathfrak{F}$ – наследственная насыщенная решеточная формация, содержащая все нильпотентные группы, и группа $G \notin \mathfrak{F}$. Тогда следующие утверждения эквивалентны:

- (1) группа G содержит максимальную ненормальную подгруппу M и каждая максимальная в M подгруппа субнормальна в G ;
- (2) каждая 2-максимальная подгруппа группы G субнормальна в G ;
- (3) каждая строго 2-максимальная подгруппа группы G субнормальна в G ;
- (4) группа G содержит максимальную не $\mathfrak{F}$ -нормальную подгруппу M и каждая максимальная в M подгруппа $\mathfrak{F}$ -субнормальна в G ;
- (5) каждая 2-максимальная подгруппа группы G $\mathfrak{F}$ -субнормальна в G ;
- (6) каждая строго 2-максимальная подгруппа группы G $\mathfrak{F}$ -субнормальна в G ;
- (7) все собственные подгруппы в группе G абелевы.

Доказательство теоремы 5.1 осуществляется по следующей схеме. Используя результаты работ [9], [10], [25] вначале проверяем, что утверждения (1), (2), (3) и (7) эквивалентны. Затем доказываем, что для решеточной формации утверждения (4), (5), (6) и (7) эквивалентны.

Отметим, что частными случаями доказанной теоремы являются результаты работ [9], [10], [24] и [25].

ЛИТЕРАТУРА

1. GAP – Groups, Algorithms, Programming: a System for Computational Discrete Algebra [Electronic resource]. – Ver. 4.11.1 released on 02 March 2021. – Mode of access: <http://www.gap-system.org>. – Date of access: 20.04.2021.
2. Monakhov, V.S. Finite groups with $\mathbb{P}$ -subnormal subgroups / V.S. Monakhov, V.N. Kniagina // Ricerche Mat. – 2013. – Vol. 62. – P. 307–322.
3. Meng, H. Weak second maximal subgroups in solvable groups / H. Meng, X. Guo // J. Algebra. – 2019. – Vol. 517. – P. 112–118.
4. Коуровская тетрадь. Нерешенные вопросы теории групп / 19-е изд. доп. – Новосибирск:

Институт математики Сибирского отделения РАН, 2018. – 248 с.

5. Meng, H. Overgroups of weak second maximal subgroups / H. Meng, X. Guo // *Bull. Aust. Math. Soc.* – 2019. – Vol. 99. – P. 83–88.

6. Чжан, Ц. О вторых максимальных подгруппах конечных групп / Ц. Чжан, Ч. Гао, Л. Мяо // *Сибирский математический журнал.* – 2021. – Vol. 62. – С. 221–225.

7. Маслова, Н.В. Конечные группы, все максимальные подгруппы которых холловы / Н.В. Маслова, Д.О. Ревин // *Математические труды.* – 2012. – Т. 22, № 2. – С. 105–126.

8. Монахов, В.С. Конечные π -разрешимые группы с холловыми максимальными подгруппами / В.С. Монахов // *Математические заметки.* – 2008. – Т. 84, № 3. – С. 390–394.

9. Луценко, Ю.В. Конечные группы с субнормальными вторыми или третьими максимальными подгруппами / Ю.В. Луценко, А.Н. Скиба // *Математические заметки.* – 2012. – Т. 91, № 5. – С. 730–740.

10. Горбатова, Ю.В. Конечные группы с субнормальными строго 2- или 3-максимальными подгруппами / Ю.В. Горбатова, М.Н. Коновалова // *Вестник Омского университета.* – 2019. – Т. 24, № 3. – С. 4–12.

11. Kovaleva, V.A. Finite soluble groups with all n -maximal subgroups $\mathfrak{F}$ -subnormal / V.A. Kovaleva, A.N. Skiba // *J. Group Theory.* – 2014. – Vol. 17, № 2. – P. 273–290.

12. Монахов, В.С. О группах с формационно субнормальными 2-максимальными подгруппами / В.С. Монахов // *Математические заметки.* – 2019. – Т. 105, № 2. – С. 269–277.

13. Коновалова, М.Н. Конечные группы с $\mathfrak{F}$ -субнормальными подгруппами / М.Н. Коновалова // *Математические заметки.* – 2020. – Vol. 108, № 2. – С. 215–223.

14. Monakhov, V.S. On groups with formation subnormal strictly 2-maximal subgroups / V.S. Monakhov, M.N. Konovalova // *Ukrains'kyi Matematychnyi Zhurnal.* – Jan. 2021. – Vol. 73, № 1. – P. 107–116.

15. Монахов, В.С. Введение в теорию конечных групп и их классов / В.С. Монахов. – Минск: Вышэйшая школа, 2006. – 207 с.

16. Шеметков, Л.А. Формации конечных групп / Л.А. Шеметков. – Москва: Наука, 1978. – 271 с.

17. Huppert, B. Endliche Gruppen I / B. Huppert. – Berlin; Heidelberg; New York: Springer, 1967. – 793 p.

18. Connor, T. An atlas of subgroup lattices of finite almost simple groups / T. Connor, D. Leemans // *Ars Math. Contemp.* – 2015. – Vol. 8. – P. 259–266.

19. *Atlas of Finite Groups: Maximal Subgroups and Ordinary Characters for Simple Groups* / J.H. Conway [et al.] – Oxford: Clarendon Press. – 1985. – 286 p.

20. Dokchitser, T. GroupNames [Electronic resource] / T. Dokchitser. – Mode of access: <http://groupnames.org>. – Date of access: 30.04.2021.

21. Burness, T.C. On the length and depth of finite groups / T.C. Burness, M.W. Liebeck, A. Shalev // *Proc. London Math. Soc.* – 2019. – № 119 (3). – P. 1464–1492.

22. Монахов, В.С. Конечные группы с абнормальными и $\mathfrak{U}$ -субнормальными подгруппами / В.С. Монахов // *Сибирский математический журнал.* – 2016. – Т. 57, № 2. – С. 447–462.

23. Васильев, А.Ф. О решетках подгрупп конечных групп / А.Ф. Васильев, С.Ф. Каморников, В.Н. Семенчук // *Бесконечные группы и примыкающие алгебраические структуры: сб. науч. ст.* – Киев: Ин-т матем. АН Украины, 1993. – С. 27–54.

24. Коновалова, М.Н. Конечные группы с некоторыми формационно субнормальными подгруппами / М.Н. Коновалова, И.Л. Сохор // *Проблемы физики, математики и техники.* – 2019. – № 4 (41). – С. 51–54.

25. Коновалова, М.Н. Конечные группы с некоторыми субнормальными 2-максимальными подгруппами / М.Н. Коновалова, В.С. Монахов // *Проблемы физики, математики и техники.* – 2020. – № 2 (43). – С. 75–79.

Поступила в редакцию 28.06.2021.

Информация об авторах

Коновалова Марина Николаевна – аспирантка
Монахов Виктор Степанович – д.ф.-м. н., профессор
Сохор Ирина Леонидовна – к.ф.-м.н., доцент