

ПОЛИАДИЧЕСКИЕ ФАКТОРГРУППЫ ПОЛИАДИЧЕСКИХ ГРУПП СПЕЦИАЛЬНОГО ВИДА. II

А.М. Гальмак

Белорусский государственный университет пищевых и химических технологий, Могилёв

POLYADIC QUOTIENT GROUPS OF POLYADIC GROUPS OF A SPECIAL FORM. II

A.M. Gal'mak

Belarusian State University of Food and Chemical Technologies, Mogilev

Аннотация. В статье продолжается изучение l -арных факторгрупп полиадических групп специального вида.

Ключевые слова: полиадическая операция, полуинвариантная l -арная подгруппа, n -полуинвариантная l -арная подгруппа, факторгруппа, конгруэнция, смежный класс.

Для цитирования: Гальмак, А.М. Полиадические факторгруппы полиадических групп специального вида. II / А.М. Гальмак // Проблемы физики, математики и техники. – 2025. – № 4 (65). – С. 62–66. – DOI: https://doi.org/10.54341/20778708_2025_4_65_62. – EDN: RJSZOU

Abstract. The study on the l -ary quotient groups of polyadic groups of a special form is carried on.

Keywords: polyadic operation, semiinvariant l -ary subgroup, n -semiinvariant l -ary subgroup, quotient group, congruence, coset.

For citation: Gal'mak, A.M. Polyadic quotient groups of polyadic groups of a special form. II / A.M. Gal'mak // Problems of Physics, Mathematics and Technics. – 2025. – № 4 (65). – P. 62–66. – DOI: https://doi.org/10.54341/20778708_2025_4_65_62 (in Russian). – EDN: RJSZOU

Введение

Данная статья, посвящённая изучению l -арных факторгрупп l -арной группы $\langle A^k, \eta_{s, \sigma, k} \rangle$ специального вида по её полуинвариантным l -арным подгруппам, является продолжением статьи [1] и составляется с ней единое целое, что отражено в названиях обеих статей. В связи с этим нумерация разделов в настоящей статье продолжает нумерацию разделов в [1]. Сохраняется преемственность в отношении соглашений, определений и обозначений из [1], все они остаются в силе и в данной статье. В ней ссылки на результаты из работы [1] даются без указания на эту работу. Например, ссылка на теорему 2.1 означает, что имеется в виду теорема 2.1 из раздела 2 в [1]. Одной из основных целей данной статьи является доказательство того, что в случае цикличности n -арной факторгруппы $\langle A / B, \eta \rangle$ любой её смежный класс может быть l -арной подгруппой l -арной группы $\langle A^k, \eta_{s, \sigma, k} \rangle$.

3 Вспомогательные результаты

Сформулируем несколько утверждений, используемых при получении основного результата.

Лемма 3.1. Пусть $\langle A, \eta \rangle$ – n -арная группа, $\langle B, \eta \rangle$ – её полуинвариантная n -арная подгруппа. Тогда

© Гальмак А.М., 2025

62

$$\overline{\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1})} = \eta(\overline{a} \underbrace{B \dots B}_{n-1}).$$

Доказательство. Используя полуинвариантность $\langle B, \eta \rangle$ в $\langle A, \eta \rangle$ и определение косого элемента, получим

$$\begin{aligned} & \eta(\eta(\overline{a} \underbrace{B \dots B}_{n-1}) \underbrace{\eta(a \dots B) \dots \eta(a \dots B)}_{n-1}) = \\ & = \eta(\eta(\overline{a} \underbrace{a \dots a}_{n-1}) \underbrace{B \dots B}_{n-1}) = \eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}), \end{aligned}$$

то есть

$$\begin{aligned} & \eta(\eta(\overline{a} \underbrace{B \dots B}_{n-1}) \underbrace{\eta(a \dots B) \dots \eta(a \dots B)}_{n-1}) = \\ & = \eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}). \end{aligned}$$

Следовательно, доказываемое равенство верно. \square

Лемма 3.2. Пусть $\langle A, \eta \rangle$ – n -арная группа, $\langle B, \eta \rangle$ – её полуинвариантная n -арная подгруппа. Тогда

$$(\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}))^{[m]} = \eta(a^{[m]} \underbrace{B \dots B}_{n-1})$$

для любого целого m .

Доказательство. Для $m = 2$ доказываемое равенство верно. Поэтому считаем $m \geq 3$.

Используя определение полиадической степени для случая $m = 0$, получим

$$(\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}))^{[0]} = \eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}) = \eta(a^{[0]} \underbrace{B \dots B}_{n-1}).$$

Если $m > 0$, то, используя определение полиадической степени и полуинвариантность $\langle B, \eta \rangle$ в $\langle A, \eta \rangle$, получим

$$\begin{aligned} (\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}))^{[m]} &= \underbrace{\eta(\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}) \dots \eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}))}_{m(n-1)+1} \\ &= \eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1} \dots a \underbrace{B \dots B}_{n-1}) = \eta(a \dots a \underbrace{B \dots B}_{n-1}) = \\ &= \eta(\eta(a \dots a) \underbrace{B \dots B}_{n-1}) = \eta(a^{[m]} \underbrace{B \dots B}_{n-1}), \end{aligned}$$

то есть для $m > 0$ доказываемое равенство верно.

Если $m < 0$, то, снова используя определение полиадической степени, полуинвариантность $\langle B, \eta \rangle$ в $\langle A, \eta \rangle$, а также лемму 3.1, получим

$$\begin{aligned} (\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}))^{[m]} &= \underbrace{\eta(\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}) \dots \eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}))}_{-2m} \\ &= \eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1} \dots \eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1})) = \\ &= \eta(\eta(\bar{a} \underbrace{B \dots B}_{n-1}) \dots \eta(\bar{a} \underbrace{B \dots B}_{n-1})) = \\ &= \eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1} \dots \eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1})) = \\ &= \eta(\eta(\bar{a} \dots \bar{a} a \dots a) \underbrace{B \dots B}_{n-1}) = \eta(a^{[m]} \underbrace{B \dots B}_{n-1}), \end{aligned}$$

то есть для $m < 0$ доказываемое равенство верно. \square

Замечание 3.1. Так как

$$\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1})^{[-1]} = \overline{\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1})}, \quad a^{[-1]} = \bar{a},$$

то лемма 3.1 содержитя в лемме 3.2 при $m = -1$.

Лемма 3.3. Пусть $\langle A, \eta \rangle$ – n -арная группа, $\langle B, \eta \rangle$ – её n -арная подгруппа, $d_1, \dots, d_{l-1} \in A$. Тогда:

1) если существуют элементы $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$ такие, что последовательности $d_1 \dots d_{l-1}$ и $b_1 \dots b_{n-1}$ эквивалентны в смысле Поста, то

$$\eta(d_1 \dots d_{l-1} B) = B, \quad (3.1)$$

$$\eta(B d_1 \dots d_{l-1}) = B; \quad (3.2)$$

2) если верно равенство (3.1) или равенство (3.2), то существуют элементы $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$ такие, что последовательности $d_1 \dots d_{l-1}$ и $b_1 \dots b_{n-1}$ эквивалентны в смысле Поста.

Доказательство. 1) Так как последовательности $d_1 \dots d_{l-1}$ и $b_1 \dots b_{n-1}$ эквивалентны в смысле Поста, то

$$\eta(d_1 \dots d_{l-1} b) = \eta(b_1 \dots b_{n-1} b)$$

для любого $b \in B$, откуда следует

$$\eta(d_1 \dots d_{l-1} B) \subseteq B.$$

Так как для любого $b \in B$ уравнение

$$b = \eta(b_1 \dots b_{n-1} x)$$

имеет решение $x = c \in B$, то

$$b = \eta(b_1 \dots b_{n-1} c),$$

откуда и из эквивалентности в смысле Поста последовательностей $d_1 \dots d_{l-1}$ и $b_1 \dots b_{n-1}$ следует

$$b = \eta(d_1 \dots d_{l-1} c).$$

Следовательно,

$$B \subseteq \eta(d_1 \dots d_{l-1} B).$$

Из доказанных включений следует требуемое равенство.

2) Если верно равенство (3.1), то для любого $c \in B$ имеем

$$\eta(d_1 \dots d_{l-1} c) = b \in B. \quad (3.3)$$

А так как $\langle B, \eta \rangle$ – n -арная группа, то для $c, b \in B$, в ней разрешимо уравнение

$$\eta(x_1 \dots x_{n-1} c) = b.$$

Следовательно, найдутся такие $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$, что

$$\eta(b_1 \dots b_{n-1} c) = b. \quad (3.4)$$

Из равенства правых частей в (3.3) и (3.4) следует равенство

$$\eta(d_1 \dots d_{l-1} c) = \eta(b_1 \dots b_{n-1} c),$$

что означает эквивалентность в смысле Поста последовательностей $d_1 \dots d_{l-1}$ и $b_1 \dots b_{n-1}$.

Для равенства (3.2) доказательство проводится аналогично. \square

Следствие 3.1. Пусть $\langle A, \eta \rangle$ – n -арная группа, $\langle B, \eta \rangle$ – её n -арная подгруппа, $d \in A$. Тогда:

1) если существуют элементы $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$ такие, что последовательности $\underbrace{d \dots d}_{l-1}$ и

$b_1 \dots b_{n-1}$ эквивалентны в смысле Поста, то

$$\eta(\underbrace{d \dots d}_{l-1} B) = B, \quad (3.5)$$

$$\eta(B \underbrace{d \dots d}_{l-1}) = B; \quad (3.6)$$

2) если верно равенство (3.5) или равенство (3.6), то существуют элементы $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$ такие, что последовательности $\underbrace{d \dots d}_{l-1}$ и

$b_1 \dots b_{n-1}$ эквивалентны в смысле Поста.

Лемма 3.4. Пусть $\langle A, \eta \rangle$ – n -арная группа, $\langle B, \eta \rangle$ – её n -арная подгруппа, существуют натуральное i и элементы $a \in A$, $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$ такие, что последовательности $\underbrace{a \dots a}_{i(n-1)}$ и

$b_1 \dots b_{n-1}$ эквивалентны в смысле Поста. Тогда последовательность $\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{i(n-1)}$ эквивалентна в

смысле Поста последовательности $c_1 \dots c_{n-1}$ для некоторых элементов $c_1, \dots, c_{n-1} \in B$.

Доказательство. Так как последовательность $\underbrace{\bar{a} a \dots a}_{n-2}$ – нейтральная, то нейтральной является и последовательность

$$\underbrace{\bar{a} \underbrace{a \dots a}_{n-2} \dots \bar{a}}_{i(n-1)} \underbrace{a \dots a}_{n-2},$$

которая в силу перестановочности любого элемента со своим косым, эквивалентна в смысле Поста последовательности

$$\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{i(n-1)} \underbrace{a \dots a}_{i(n-1)} \underbrace{a \dots a}_{i(n-1)},$$

также являющейся нейтральной. Заменив в этой последовательности каждую последовательность $\underbrace{a \dots a}_{i(n-1)}$ эквивалентной в смысле Поста последо-

вательностью $b_1 \dots b_{n-1}$, получим нейтральную последовательность

$$\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{i(n-1)} \underbrace{b_1 \dots b_{n-1} \dots b_1 \dots b_{n-1}}_{n-2}, \quad (3.7)$$

которая эквивалентна в смысле Поста последовательности

$$\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{i(n-1)} b_1 \dots b_{n-2} c, \quad (3.8)$$

где

$$c = \eta(b_{n-1} \underbrace{b_1 \dots b_{n-1} \dots b_1 \dots b_{n-1}}_{n-3}) \in B.$$

Из нейтральности последовательности (3.7), а значит и последовательности (3.8), следует

$$\eta(\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{i(n-1)} b_1 \dots b_{n-2} c) = b$$

для любого $b \in B$, откуда

$$\eta(\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{i(n-1)} d) = b, \quad (3.9)$$

где

$$d = \eta(b_1 \dots b_{n-2} c) \in B.$$

Так как $\langle B, \eta \rangle$ – n -арная группа, то для $b, d \in B$ в ней разрешимо уравнение

$$\eta(x_1 \dots x_{n-1} d) = b.$$

Следовательно, найдутся такие $c_1, \dots, c_{n-1} \in B$, что

$$\eta(c_1 \dots c_{n-1} d) = b. \quad (3.10)$$

Из (3.9) и (3.10) следует равенство

$$\eta(\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{i(n-1)} d) = \eta(c_1 \dots c_{n-1} d),$$

что означает эквивалентность в смысле Поста последовательностей $\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{i(n-1)}$ и $c_1 \dots c_{n-1}$. \square

Полагая в лемме 3.4 $i = 1$, получим

Следствие 3.2. Пусть $\langle A, \eta \rangle$ – n -арная группа, $\langle B, \eta \rangle$ – её n -арная подгруппа, существуют элементы $a \in A$, $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$ такие, что последовательности $\underbrace{a \dots a}_{n-1}$ и $b_1 \dots b_{n-1}$ эквива-

лентны в смысле Поста. Тогда последовательность $\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{n-1}$ эквивалентна в смысле Поста

последовательности $c_1 \dots c_{n-1}$ для некоторых $c_1, \dots, c_{n-1} \in B$.

Нам понадобится также следующая

Теорема 3.1. Пусть $\langle B, \eta \rangle$ – n -арная подгруппа полуабелевой n -арной группы $\langle A, \eta \rangle$, отличная от неё; существуют элементы $d \in A$, $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$ такие, что последовательности $\underbrace{d \dots d}_{l-1}$ и $b_1 \dots b_{n-1}$ эквивалентны в смысле Поста;

подстановка σ из S_k удовлетворяет условию $\sigma^n \neq \sigma$, $\sigma^l = \sigma$. Тогда справедливы все утверждения теоремы 2.1. Кроме того, универсальная алгебра $\langle H^k, \eta_{n, \sigma, k} \rangle$ является полуинвариантной, но не n -полуинвариантной l -арной подгруппой в полуабелевой l -арной группе $\langle A^k, \eta_{n, \sigma, k} \rangle$, которая не является n -полуабелевой.

Доказательство. 1) В полуабелевой n -арной группе $\langle A, \eta \rangle$ n -арная подгруппа $\langle B, \eta \rangle$ является полуинвариантной. Кроме того, по условию теоремы, при $i = 2$ подстановка $\sigma^{(i-1)(n-1)} = \sigma^{n-1}$ не является тождественной. Таким образом, выполняются все условия теоремы 2.1. Следовательно, справедливы все утверждения этой теоремы. Осталось применить теорему 4.5 из [2], по которой $\langle A^k, \eta_{n, \sigma, k} \rangle$ – полуабелева l -арная группа, не являющаяся n -полуабелевой. \square

Замечание 3.2. Если σ – нетождественная подстановка, для которой подстановка σ^n является тождественной, то $\sigma^n \neq \sigma$, $\sigma^l = \sigma$, где $l = n(n-1) + 1$. Поэтому в теореме 3.1 в качестве подстановки σ можно выбрать нетождественную подстановку с условием $\sigma^{n+1} = \sigma$ и положить $l = n(n-1) + 1$.

4 Основные результаты

Теорема 4.1. Пусть $\langle B, \eta \rangle$ – полуинвариантная n -арная подгруппа n -арной группы $\langle A, \eta \rangle$, отличная от неё; n -арная факторгруппа $\langle A / B, \eta \rangle$ является циклической, порождаемой смежным классом $\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1})$; последова-

тельность $\underbrace{a \dots a}_{l-1}$ эквивалентна в смысле Поста последовательности $b_1 \dots b_{n-1}$ для некоторых $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$; подстановка σ из S_k удовлетворяет условию $\sigma^l = \sigma$. Тогда:

1) для любого смежного класса H n -арной факторгруппы $\langle A / B, \eta \rangle$ декартова степень H^k замкнута относительно l -арной операции $\eta_{s, \sigma, k}$, а универсальная алгебра $\langle H^k, \eta_{s, \sigma, k} \rangle$ является полуинвариантной l -арной подгруппой l -арной группы $\langle A^k, \eta_{s, \sigma, k} \rangle$;

2) если для некоторого $i = 2, \dots, s$ подстановка $\sigma^{(i-1)(n-1)}$ не является тождественной, то l -арная подгруппа $\langle H^k, \eta_{s, \sigma, k} \rangle$ не является n -полуинвариантной в $\langle A^k, \eta_{s, \sigma, k} \rangle$.

Доказательство. 1) Так как n -арная факторгруппа $\langle A / B, \eta \rangle$ является циклической,

порождаемой элементом $\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1})$, то любой элемент H этой n -арной факторгруппы совпадает с некоторой степенью порождающего элемента. Будем для определенности считать

$$H = (\eta(a \underbrace{B \dots B}_{n-1}))^{[r]}$$

для некоторого целого r . По лемме 3.2

$$H = \eta(a^{[r]} \underbrace{B \dots B}_{n-1}).$$

Пусть $r \geq 0$. Так как последовательность $a \dots a$ эквивалентна в смысле Поста последовательности $b_1 \dots b_{n-1}$ для некоторых элементов $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$, то

$$\begin{aligned} \eta(\eta(a^{[r]} \dots a^{[r]}) B \dots B) &= \eta(a^{[r]} a^{[r]} \dots a^{[r]} B \dots B) = \\ &= \eta(a^{[r]} \eta(a \dots a) \dots \eta(a \dots a) B \dots B) = \\ &= \eta(a^{[r]} a \dots a \dots a \dots a B \dots B) = \\ &= \eta(a^{[r]} b_1 \dots b_{n-1} \dots b_1 \dots b_{n-1} B \dots B) = \\ &= \eta(a^{[r]} \underbrace{B \dots B}_{n-1}), \end{aligned}$$

то есть

$$\eta(\eta(a^{[r]} \dots a^{[r]}) B \dots B) = \eta(a^{[r]} \underbrace{B \dots B}_{n-1}). \quad (4.1)$$

Если теперь $r < 0$, то по лемме 3.4 последовательность

$$\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{l-1} = \underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{s(n-1)}$$

эквивалентна в смысле Поста последовательности $c_1 \dots c_{n-1}$ для некоторых $c_1, \dots, c_{n-1} \in B$. А так как, кроме того, последовательность $a \dots a$ эк-

вивалентна в смысле Поста последовательности $b_1 \dots b_{n-1}$ для некоторых $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$, то

$$\begin{aligned} \eta(\eta(a^{[r]} \dots a^{[r]}) B \dots B) &= \eta(a^{[r]} a^{[r]} \dots a^{[r]} B \dots B) = \\ &= \eta(a^{[r]} \eta(\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{-2r} a \dots a) \dots \eta(\underbrace{\bar{a} \dots \bar{a}}_{-2r} a \dots a) B \dots B) = \\ &= \eta(a^{[r]} \underbrace{\bar{a} \dots \bar{a} \dots \bar{a} \dots \bar{a}}_{-2r} \underbrace{a \dots a \dots a \dots a}_{-r(n-3)+1} \underbrace{B \dots B}_{n-1}) = \\ &= \eta(a^{[r]} \underbrace{c_1 \dots c_{n-1} \dots c_1 \dots c_{n-1}}_{-2r}) = \\ &= \eta(b_1 \dots b_{n-1} \dots b_1 \dots b_{n-1} \underbrace{B \dots B}_{n-1}) = \eta(a^{[r]} \underbrace{B \dots B}_{n-1}), \end{aligned}$$

то есть и для $r < 0$ верно равенство (4.1), следствием которого является следующее равенство

$$\begin{aligned} \eta(\overline{a^{[r]}} \underbrace{a^{[r]} \dots a^{[r]}}_{n-3} \underbrace{\eta(\eta(a^{[r]} \dots a^{[r]}) B \dots B) B}_{l-1} B) &= \\ &= \eta(a^{[r]} \underbrace{a^{[r]} \dots a^{[r]}}_{n-3} \underbrace{\eta(a^{[r]} B \dots B) B}_{n-1}). \end{aligned}$$

Из этого равенства в силу нейтральности последовательности $\overline{a^{[r]}} \underbrace{a^{[r]} \dots a^{[r]}}_{n-2}$ следует равенство

$$\eta(\underbrace{a^{[r]} \dots a^{[r]}}_{l-1} B) = B.$$

Поэтому, согласно утверждению 2) следствия 3.1, последовательность $\underbrace{a^{[r]} \dots a^{[r]}}_{l-1}$ эквивалентна

в смысле Поста последовательности $u_1 \dots u_{n-1}$ для некоторых $u_1, \dots, u_{n-1} \in B$. Осталось применить утверждение 1) теоремы 2.1.

2) Применяется утверждение 4) теоремы 2.1. \square

Полагая в теореме 4.1 $i = 2$, получим следующий результат.

Теорема 4.2. Пусть $\langle B, \eta \rangle$ – полуинвариантная n -арная подгруппа n -арной группы $\langle A, \eta \rangle$, отличная от неё; n -арная факторгруппа $\langle A / B, \eta \rangle$ является циклической, порожденной смежным классом $\eta(a B \dots B)$; последовательность $a \dots a$ эквивалентна в смысле Поста

последовательности $b_1 \dots b_{n-1}$ для некоторых $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$; подстановка σ из S_k удовлетворяет условию $\sigma^l = \sigma$. Тогда:

1) для любого смежного класса H n -арной факторгруппы $\langle A / B, \eta \rangle$ декартова степень H^k замкнута относительно l -арной операции $\eta_{s, \sigma, k}$, а универсальная алгебра $\langle H^k, \eta_{s, \sigma, k} \rangle$ является полуинвариантной l -арной подгруппой l -арной группы $\langle A^k, \eta_{s, \sigma, k} \rangle$;

2) если подстановка σ^{n-1} не является тождественной, то l -арная подгруппа $\langle H^k, \eta_{s, \sigma, k} \rangle$ не является n -полуинвариантной в $\langle A^k, \eta_{s, \sigma, k} \rangle$.

Следующая теорема доказывается аналогично теореме 3.1, при этом вместо теоремы 2.1 применяется теорема 4.1.

Теорема 4.3. Пусть $\langle B, \eta \rangle$ – n -арная подгруппа полуабелевой n -арной группы $\langle A, \eta \rangle$, отличная от неё; n -арная факторгруппа $\langle A / B, \eta \rangle$ является циклической, порожденной смежным классом $\eta(a B \dots B)$; последователь-

ность $a \dots a$ эквивалентна в смысле Поста по-

следовательности $b_1 \dots b_{n-1}$ для некоторых $b_1, \dots, b_{n-1} \in B$; подстановка σ из S_k удовлетворяет условию $\sigma^n \neq \sigma$, $\sigma^l = \sigma$. Тогда справедливы все утверждения теоремы 4.1. Кроме того, универсальная алгебра $\langle H^k, \eta_{s, \sigma, k} \rangle$ является полуинвариантной, но не n -полуинвариантной l -арной подгруппой в полуабелевой l -арной группе

$\langle A^k, \eta_{n, \sigma, k} \rangle$, которая не является n -полубелевой.

Замечание 4.1. В теореме 4.3, как и в теореме 3.1, в качестве подстановки σ можно выбрать нетождественную подстановку из замечания 3.2.

Бинарный случай ($n = 2$) Сформулируем следствия из теорем 4.1–4.3 для $n = 2$.

Теорема 4.4. Пусть B – нормальная подгруппа группы A , отличная от неё; факторгруппа A / B является циклической, порождаемой смежным классом aB ; $a^{l-1} \in B$, подстановка σ из S_k удовлетворяет условию $\sigma^l = \sigma$. Тогда:

1) для любого смежного класса H факторгруппы A / B декартова степень H^k замкнута относительно l -арной операции $[]_{l, \sigma, k}$, а универсальная алгебра $\langle H^k, []_{l, \sigma, k} \rangle$ является полуинвариантной l -арной подгруппой l -арной группы $\langle A^k, []_{l, \sigma, k} \rangle$;

2) если для некоторого $i = 2, \dots, l - 1$ подстановка σ^{i-1} – не является тождественной, то l -арная подгруппа $\langle H^k, []_{l, \sigma, k} \rangle$ не является инвариантной в $\langle A^k, []_{l, \sigma, k} \rangle$.

Теорема 4.5. Пусть B – нормальная подгруппа группы A , отличная от неё; факторгруппа A / B является циклической, порождаемой смежным классом aB ; $a^{l-1} \in B$, подстановка σ из S_k удовлетворяет условию $\sigma^l = \sigma$. Тогда:

1) для любого смежного класса H факторгруппы A / B декартова степень H^k замкнута относительно l -арной операции $[]_{l, \sigma, k}$, а универсальная алгебра $\langle H^k, []_{l, \sigma, k} \rangle$ является полуинвариантной l -арной подгруппой l -арной группы $\langle A^k, []_{l, \sigma, k} \rangle$;

2) если подстановка σ не является тождественной, то l -арная подгруппа $\langle H^k, []_{l, \sigma, k} \rangle$ не является инвариантной в $\langle A^k, []_{l, \sigma, k} \rangle$.

Теорема 4.6. Пусть B – подгруппа белевой группы A , отличная от неё; факторгруппа A / B является циклической, порождаемой смежным классом aB ; $a^{l-1} \in B$, подстановка σ из S_k удовлетворяет условию $\sigma^2 \neq \sigma$, $\sigma^l = \sigma$. Тогда для любого смежного класса H факторгруппы A / B

декартова степень H^k замкнута относительно l -арной операции $[]_{l, \sigma, k}$, а универсальная алгебра $\langle H^k, []_{l, \sigma, k} \rangle$ является полуинвариантной, но неинвариантной l -арной подгруппой в полуабелевой l -арной группе $\langle A^k, []_{l, \sigma, k} \rangle$, которая не является белевой.

Полагая в теореме 4.6 $l = 3$, получим

Следствие 4.1. Пусть для нетождественной подстановки $\sigma \in S_k$ подстановка σ^2 является тождественной, B – подгруппа белевой группы A , отличная от неё; факторгруппа A / B является циклической, порождаемой смежным классом aB ; $a^2 \in B$. Тогда для любого смежного класса H факторгруппы A / B декартова степень H^k замкнута относительно тернарной операции $[]_{3, \sigma, k}$, а универсальная алгебра $\langle H^k, []_{3, \sigma, k} \rangle$ является полуинвариантной, но неинвариантной тернарной подгруппой в полуабелевой тернарной группе $\langle A^k, []_{3, \sigma, k} \rangle$, которая не является белевой.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гальмак, А.М. Полиадические факторгруппы полиадических групп специального вида. I / А.М. Гальмак // Проблемы физики, математики и техники. – 2025. – № 3 (64). – С. 84–89.

2. Гальмак, А.М. Перестановочность элементов в полиадических группоидах специального вида / А.М. Гальмак // Проблемы физики, математики и техники. – 2018. – № 3 (36). – С. 70–75.

Поступила в редакцию 09.09.2025.

Информация об авторах

Гальмак Александр Михайлович – д.ф.-м.н., профессор